


РАЗГОВОР О ХИЩНЫХ ЗВЕРЯХ

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ





На нашей планете живёт множество животных. Большая часть из них питается тем, что растёт из земли – растениями и грибами. Есть животные, которые питаются другими животными. Их организмы устроены иначе, чем у растительноядных. Для того чтобы выжить, им необходимо есть мясо. Называются они хищными. Это название происходит от слова «хватать, похищать».

Размеры и общий облик хищных весьма различны – от мелких ласок до громадных медведей. Среди хищных преобладают плотоядные, реже всеядные; широко распространено питание падалью. Большинство ведёт наземный образ жизни, многие могут лазать по деревьям. Деятельны преимущественно ночью и в сумерках.

В этом издании мы хотим познакомить читателей с представителями нескольких семейств животных, которые относятся к Отряду хищные (Carnivora) и Отряду насекомоядные (Insectivora или Eulipotyphla). На территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье», хищные звери находятся под охраной, их численность стабильна. Все они представляют интерес и являются важными звеньями экосистемы. На каждый вопрос о 12-ти видах вы найдёте ответ и узнаете о местах обитания зверей, их внешнем виде, размерах, рационе питания, периоде активности и интересных фактах.



МЕСТООБИТАНИЕ



ВНЕШНИЙ ВИД



РАЗМЕР



ПИТАНИЕ



АКТИВНОСТЬ



ЭТО ИНТЕРЕСНО!



ЕСТЬ ЛИ У БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ?

В экосистеме Байкала у нерпы нет естественных врагов: она находится на вершине пищевой цепочки.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



Ареал байкальского тюленя (нерпы) *Pusa sibirica* Gmel. ограничен озером Байкал. В Забайкальском национальном парке нерпа в летний период собирается на островах Ушканьего архипелага.



Туловище имеет веретенообразную форму, постепенно переходит в шею, заканчивающуюся небольшой головой. Задние лапы всегда вытянуты назад. Обе пары лап покрыты волосами, на пальцах хорошо развиты когти. Наружная ушная раковина отсутствует. Окраска взрослых нерп: верх тела буро-серебристо-серый, низ более светлый.



Длина тела от 110 до 160 см, средняя масса 60 кг. Самцы больше самок. Их максимальная длина достигает 180 см, а вес может достигать до 150 кг. У самок максимальная длина тела 160 см, вес до 110 кг.



Рыба: малая и большая голомянки, бычки – длиннокрылый и желтокрылый, песчаная, каменная, пестрокрылая, большеголовая и другие виды широколобок. Суточный рацион – 3-5 кг рыбы.



Зимой на лёд не выходит и дышит в отдушинах, которые делает ещё в тонком льду. Под снегом на торосистых участках самки устраивают логова, в них с февраля до конца марта рождаются нерпята – бельки.



- Изготавливать отдушины или продухи во льду является врождённым инстинктом зверя.
- Максимальная глубина погружения нерпы – до 300-400 м, максимальная скорость движения в воде – 25 км в час, максимальная продолжительность пребывания под водой – 40 минут.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ КОСОЛАПЫЙ?

Косолапая походка бурого медведя *Ursus arctos* L. обусловлена строением ноги. Медведь относится к стопоходящим животным, т.е. при ходьбе опирается на всю стопу. При этом он ставит лапу пяткой наружу и носком внутрь. Кроме того, зверь неуклюже переваливается с боку на бок при ходьбе оттого, что одновременно делает шаг двумя лапами с одной стороны тела – задней и передней, а затем с другой.

ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



В Забайкальском национальном парке бурый медведь живёт в лесах полуострова Святой Нос, Баргузинского хребта, на Чивыркуйском перешейке. Обычен на побережье Байкала, в весенне-летний период на елаканах (лугово-степные участки в виде островков среди леса).



Телосложение грузное, голова массивная, уши короткие, стоячие, глаза небольшие. Короткий хвост скрыт в мехе. Зверь стопоходящий, конечности короткие, пятипалые; когти притупленные, невяжные. Подошвы голые. Мех густой, тёмно-бурый. Длина волос на брюхе достигает 15 см.



Размер тела географически изменчив. Средняя длина 1,2-2,5 м при высоте в холке до 1,5 м, вес 300-600 кг. Наиболее крупные медведи живут на Дальнем Востоке России.



Всеядный хищник. В кормовой рацион входят корневища, стебли крупнотравья, злаки и зонтичные растения, всевозможные ягоды, кедровые семена, беспозвоночные животные (муравьи, жуки, моллюски, личинки ос, пчёл и шмелей), древесные мхи, лишайники, копытные животные.



Ведёт сумеречный и ночной образ жизни, но нередко бывает активен и в другое время суток. Берлоги устраивает в ущельях гор, в зарослях кедрового стланика, в береговых обрывах и в корнях деревьев. Одной и той же берлогой зверь пользуется в течение десятка лет.



Вес новорожденного медвежонка около 500 грамм. По достижении взрослого возраста масса тела детёныша возрастает в тысячу раз и более. Если сравнить с человеком, то в этом случае можно сказать, что вес взрослого мужчины составил бы приблизительно 6 000 кг.

ПОЧЕМУ ВОЛК ВО ВРЕМЯ ВОЯ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ К НЕБУ?

Это связано с особенностями анатомического строения гортани. В таком положении в гортани образуется просвет и звук становится более чистым и громким.



На территории Забайкальского национального парка живёт две семьи волков *Canis lupus* L., которые в зимний период собираются в стаю численностью 4-6 животных. Летом волки обитают в районе реки Малый Чивыркуй, заходят в окрестности озера Арангатуй.

Крупный зверь, похожий на собаку. Стройное и сильное туловище, хвост пушистый и опущен вниз, составляя с задними лапами острый угол. На передних лапах пять пальцев, на задних – четыре. Зубы очень крупные и сильные. Окраска серая с тёмным «седлом» на спине. Мех грубый.

Длина тела 105-160 см, хвоста 35-52 см, масса 40-65 кг. Длина отпечатка лапы 12-18 см, ширина до 5,5-8 см.

Копытные, зайцы-беляки, лисицы, грызуны, ондатра, птицы и их яйца, рыба. В весенне-летне-осенний период добавляется растительная пища: различные злаки, травы, ягоды черники, голубики, брусники. В голодное время хищники едят падаль.

Волки – ночные хищники. Днём они активны в период гона, во время выкармливания детёнышей или при скудных запасах кормов. Зимой волки охотятся стаями. В это время они используют разные способы охоты, которые выбираются в зависимости от условий. Выносливость хищника позволяет ему преследовать жертву по глубокому снегу длительное время.

- Зрение волков чёрно-белое, поэтому они не различают солнечное и лунное освещение.
- Волк – животное очень высокого психического уровня и обладает богатой мимикой. Специальное изучение показало у волка до десяти выражений «лица», соответствующих определенным психическим состояниям.

ПО КАКОМУ ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ГОРНОСТАЯ ОТ ЛАСКИ?

У горностая *Mustela erminea* L. конец хвоста всегда чёрный.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



Горностай живёт в лесах полуострова Святой Нос, Баргузинского хребта, по реке Малый Чивыркуй, в устье рек Большие и Малые Черемшаны, окрестностях озера Арангатуй. Самостоятельно нор не роет. Поселяется в старых и гнилых пнях, под корнями деревьев, в кучах хвороста, болотных кочках, кучах камней, расщелинах скал и даже сорочьих гнёздах. Занимает также дупла деревьев.

Тело вытянутое, гибкое, уши небольшие, закруглённые, хвост непушистый, конечности короткие, между пальцами развита плавательная перепонка. мех верха тела в зимнем наряде чисто-белый, летом бурый. Низ круглый год белый или лимонно-белый. Хвост резко двухцветный, конец всегда чёрный.

Длина тела самца 19-32 см, у самки 17-27 см, хвоста до 11 см. Масса взрослого самца около 200 г, самки 180 г.

Мышевидные грызуны, в основном, полёвки, значительно в меньшем количестве ест птиц, амфибий и рыб. В сутки съедает 40-60 г пищи. В случае изобилия кормов устраивает небольшие запасы.

Горностай большей частью активен в сумеречно-ночные часы суток, но иногда случается встретить его днём. В сильные морозы и после снегопадов активность горностая заметно снижается. При наличии запасов пищи он отсиживается 1-2 суток.

Горностаи невероятно быстры и очень подвижны, поэтому им нужно много есть – столь высокая активность требует много энергии. А едят они всё, до чего доберутся. Эти хищники нередко нападают на добычу, в несколько раз превосходящую их размерами, и отличаются абсолютным бесстрашием. Загнанный в угол горностай, не колеблясь, нападёт даже на человека или крупного хищника.

КАКОЙ ЗВЕРЁК СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ НИКАК НЕ МЕТИТ И НЕ ЗАЩИЩАЕТ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ?

Колонок *Mustela sibiricus* Pall.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



В Забайкальском национальном парке встречается в горных (полуостров Святой Нос) и равнинных лесах, придерживаясь участков с перестойными деревьями и ветровалом или с густым подлеском. В Чивыркуйском заливе был отмечен в бухте Крутая губа, а также в долине реки Малый Чивыркуй.



Это зверёк с гибким удлинённым телом, изящный и подвижный. Отличается от других представителей семейства куньих яркой охристо-палевой окраской, лишь конец морды сверху бурый, а губы и подбородок – белые. Летом общий тон меха темнее и тусклее. Голова несколько удлинена, маленькие, округлые уши слабо выдаются из меха. Хвост пушистый. Между пальцами хорошо развита перепонка.



Длина тела самца 29-39 см, хвоста 16-22 см, масса 650-1100 г. Самка размерами мельче – 25-35 см, 13-20 см, 360-700 г.



Пищухи, ондатры, бурундуки, белки, мышевидные грызуны. Охотно поедает птиц и их яйца, лягушек, насекомых, а местами – кедровые семена и ягоды. В годы повышенной численности зайца-беляка охотится на него.



Зимой постоянного убежища не имеет. Ведёт сумеречный и ночной образ жизни. В метели и при очень сильных морозах может не выходить наружу по несколько суток. При случае залезает на деревья, хорошо плавает, нередко охотится на заболоченных участках. Имея широкие лапы, легко передвигается по рыхлому снегу. Полностью оседлый вид.



Соболь является пищевым конкурентом колонку. Соболь преследует и вытесняет колонку, конкуренция обостряется в неурожайные годы. У колонка немного естественных врагов, но соболь – враг номер один. По соседству в лесу их точно не встретишь.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ПРЕДСТАВИТЕ- ЛЕМ ОТРЯДА ХИЩНЫЕ В ЗАПОВЕДНОМ ПОДЛЕМОРЬЕ?

Ласка *Mustela nivalis* L., семейство куньи.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ



Ласка живёт в разнообразных типах угодий. Селится в поймах рек, речушек, озёр, стариц. В горы поднимается до высоты 3500 м над уровнем моря.

Тонкое удлинённое туловище, короткие конечности, длинная мощная шея (чуть тоньше корпуса), голова с небольшой мордочкой и округлыми широко поставленными ушами, еле выступающими кверху. Зимой мех чисто белый, летом верх тела бурый, низ белый. Хвост окрашен так же, как и спина.

Длина тела самца 13-29 см, хвоста 2-8 см, самки 11-20 см, хвоста 1,7-6 см. Масса самца 40-250 г, самок 30-120 г.


Мелкие мышевидные грызуны, водяная полёвка, насекомоядные животные, земноводные, насекомые, яйца птиц. Поедает также растительные корма – семена, плоды, ягоды. В сутки съедает 20-40 г корма.

Чёткого ритма суточной активности у ласки нет. Она активна большей частью в сумерки и ночью, но нередко её можно встретить и днём. Зимой часто охотится под снегом, причём проникает туда через естественные отверстия около стволов деревьев, у валежника.

Ласка добывает мышевидных грызунов гораздо больше, чем может съесть в один приём. При избытке кормов делает запасы, в одном складе находили по несколько сот умерщвлённых животных. Этим зверёк приносит несомненную пользу в борьбе с вредителями.

ЗАЧЕМ ЛИСИЦЕ ТАКОЙ РОСКОШНЫЙ ХВОСТ?

Хвост служит лисице рулём, помогающим круто изменять направление бега во время охоты. Он является балансиrom и противовесом на поворотах. А ещё лисий хвост – это тёплое «одеяло», т.к. длина шерсти на нём такова, что даже в сильные морозы зверь может укрыться им и быстро согреться. Белый конец хвоста мамы-лисицы является ориентиром для лисят в ночное время. Но главное предназначение пышного хвоста – демонстрация здоровья и социального статуса зверя.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



На территории Забайкальского национального парка обыкновенная лисица *Vulpes vulpes* L. живёт в лесах с долинами рек и участками крупных кустарников. Обычна она на Чивыркуйском перешейке, вблизи кордона Монахово, посёлков Катунь и Курбулик.



Лисица имеет стройное тело, вытянутую морду, острые уши, длинный пушистый хвост, невтяжные когти и короткие лапы. Спина ярко-рыжая, белое брюхо, тёмные лапы. Общие отличительные черты – тёмные уши и белый кончик хвоста.



Длина тела 60-90 см, хвоста 40-60 см, масса самца 5-10 кг, самки 4-8 кг.



Лисица всеядна – в её меню входят мелкие грызуны, зайцы-беляки, тетеревиные и утиные птицы, ондатра, падаль, насекомые, растительные корма.



Живёт оседло. Ведёт ночной образ жизни, днём прячется в норах и укрытиях. Однако зимой лисицу можно застать за охотой и посреди дня. Живёт одиночно, лишь на период создания семьи объединяется в пары.



- Лисица может услышать и почуять мышь под слоем снега толщиной в один метр.
- Голос у лисицы звонкий, она «тявкает». А если дело дойдёт до драки, то лисицы пронзительно визжат.

КАКОЙ МЕЛКИЙ ЗВЕРЁК НЕ МОЖЕТ ПРОЖИТЬ БЕЗ ЕДЫ И ТРЁХ ЧАСОВ? ЭТО СВЯЗАНО С ИНТЕНСИВНЫМ ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ И БЫСТРЫМ ПЕРЕВАРИВАНИЕМ ПИЩИ.

Обыкновенная бурозубка *Sorex araneus* L. Отряд насекомоядные, семейство землеройковые.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ



Обитает в лесной зоне по всей территории Забайкальского национального парка, избегает болот и сухих лесов.



Длинноносый и длиннохвостый зверёк. Верх тёмно-бурый (зимой темнее), бока с ржавым оттенком, низ серый. Хвост сверху чёрный, снизу белый, на его конце как бы узкая кисточка из удлинённых волос. Хвост покрыт густым коротким мехом. Уши почти не выступают из меха.



Длина тела 6-9 см, хвоста 4-5 см, масса до 16 г.



Насекомые, особенно много поедает жуков, дождевых червей, личинок и куколок насекомых, охотится на таких животных, как мышевидные грызуны и лягушки. Не брезгует и себе подобными, особенно зимой. Кроме животного корма, ест семена, в основном, хвойных деревьев.



Постоянная активность бурозубки обыкновенной – необходимое условие её существования. Высокая активность и повышенный тонус жизненных процессов приводят к быстрому старению организма. Этим и объясняется короткий период жизни, всего полтора года.



Очень высокая интенсивность обмена веществ этих крошечных зверьков проявляется в том, что из всех млекопитающих у них самая большая потребность в кислороде и самая высокая температура тела – выше 40°C.

У КАКОГО ЗВЕРЯ ЗАПОВЕДНОГО ПОДЛЕМОРЬЯ САМЫЙ КРАСИВЫЙ И ПРОЧНЫЙ МЕХ?

У речной выдры *Lutra lutra* L., семейство куньи.

ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ



В Забайкальском национальном парке выдра живёт по речкам Крестовая и Маркова на полуострове Святой Нос. Также по рекам Малые и Большие Черемшаны, Большой и Малый Чивыркуй, Безымянка. Нору выдра роет на берегу, один вход выходит в воду, другой – на сушу.

Тело обтекаемой формы, вытянутое, гибкое. Уши и ноздри снабжены клапаном для замыкания. Хвост длинный, мускулистый. Ноги пятипалые, укороченные с плавательной перепонкой, достигающей до конца пальцев. У неё длинные чувствительные вибриссы, которые позволяют ей улавливать перемещение добычи в темноте или мутной воде.

Длина тела до 75 см, хвоста 50 см, масса до 10 кг.

Мелкая рыба, иногда водоплавающие птицы, грызуны, лягушки, моллюски.

Активна ночью, днём спит в надёжном укрытии – в прибрежных вымоинах, под корягами. В воде она добывает пищу и здесь же ищет убежище в случае опасности. На берегу зверёк обычно только отдыхает.

- Вид занесён в Красную книгу Республики Бурятия.
- Значительную часть своей жизни речная выдра проводит в воде, поэтому её мех очень плотный и густой. Благодаря тому, что волоски подшёрстка расположены очень плотно и тесно прилегают друг к другу, шерсть не промокает, а лишь смачивается. Выбравшись на сушу, выдре достаточно резко отряхнуться, и она становится почти сухой.

НАЗВАНИЕ КАКОГО ЗВЕРЬКА В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ОЗНАЧАЕТ «НЕОБЫЧНАЯ МЫШЬ»?

Обыкновенная кутора *Neomys fodiens* Perm. Отряд насекомоядные, семейство землеройковые.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЕ



Обитает по берегам озёр, рек, ручьёв, пойменных лугов и сырых болот. Предпочитаемыми местами служат топкие берега водоёмов, поросшие деревьями, кустарником, густой травянистой растительностью и сильно захламлинные валежником.

Тело вальковатое. Голова конусовидная, заканчивается небольшим, но хорошо подвижным хоботком с длинными вибриссами. Ушные раковины скрыты в меху. Конечности небольшие, пятипалые, задние развиты лучше передних. Волосяной покров очень густой, мягкий, бархатистый, не намокает в воде. Окрас шерсти чёрный сверху и беловатый снизу. Жёсткие щетинообразные волосы, образующие оторочку на пальцах, увеличивают гребную поверхность стопы и успешно выполняют функцию плавательной перепонки.

Длина тела до 9,6 см, хвоста до 10 см, масса тела достигает 23 г.

Земляные черви, насекомые, водные беспозвоночные, мелкие позвоночные – детёныши мелких грызунов, головастики, лягушата, мелкая рыба. Добытый в воде корм кутора поедает на суше. Масса корма, съедаемого за сутки, превосходит массу самого зверька.

Наибольшую активность проявляет в ночное время, день проводит в норе. С наступлением темноты хищник выходит на охоту. Норы кутора редко роет сама, чаще использует ходы водяной полёвки. Охотно и с большим мастерством плавает и ныряет.

Слюна куторы ядовита, так как содержит специфический секрет, обладающий парализующим действием. При укусе ядовитая слюна попадает в кровь, обездвиживая, но не убивая жертву. К примеру, беспозвоночные могут оставаться в парализованном состоянии несколько дней. Благодаря чему кутора запасает пищу впрок, складывая в своих убежищах обездвиженную, но ещё живую добычу.

САМЫЙ КРУПНЫЙ ЗВЕРЬ В СЕМЕЙСТВЕ КУНЫХ, ОБИТАЮЩИЙ В ЗАПОВЕДНОМ ПОДЛЕМОРЬЕ?

Росомаха *Gulo gulo* L.



ЗАПОВЕДНОЕ
ПОДЛЕМОРЬЕ



Живёт в горной и низменной тайге. На территории Забайкальского национального парка росомаха редкий вид, встречается в долине реки Большая Черемшана.

Туловище массивное, конечности толстые и короткие, полустопоходящие, с сильными когтями. мех длинный, грубоватый, густой, хвост лохматый. Прочность меха определяется в 100%; ценность повышается особым свойством, которого нет у других мехов: он не намокает и не подвергается заиндевению, иней, осевший на нём, легко отряхивается. Преобладающий тон окраски буро-коричневый. По бокам туловища от плеч до хвоста тянется хорошо заметная широкая светлая полоса, так называемая «шлея» соломенно-белёсого, рыжего или коричневато-бурого цвета. Шлея окаймляет тёмное спинное поле – «седло» или «чепрак».

Длина тела 76-90 см, хвоста 16-23 см, масса 11- 20 кг. Самка легче и меньше самца.

Копытные – косуля, кабарга, телята лося, изюбря, северного оленя. Питается также зайцами, мелкими грызунами, птицами и их яйцами. Ловит рыбу у полыней или во время нереста; охотно подбирает дохлую рыбу. Чаще, чем другие виды семейства кунных, питается падалью и остатками от трапезы других хищников. В небольшом количестве хищник ест ягоды, кедровые семена, трутовиковые грибы и насекомых.

Ведёт сумеречный и ночной образ жизни, в снежный период и в спокойной обстановке охотится и днём. Недоеденную пищу обычно прячет. Голос похож на лай лисицы, но грубее и отрывистее.

Не волка, а именно росомаху следует считать санитаром леса. Так как росомаха, поедая падаль и физически неполноценных копытных животных, приносит пользу лесному сообществу.



Разговор о хищных зверях в вопросах и ответах.

Составитель текста: Наталья Макоева, консультант: Александр Ананин.
В издании использованы фотографии А. Сватова, В. Малеева, С. Горшкова,
С. Шитикова, А. Мурзаханова, Д. Мартина, А. Голубевой, MikeLane45/Getty
Images, из архива ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71,
тел./факс: 8 (30131) 91-5-78, <https://zapovednoe-podlemorye.ru>, e-mail: info@pdmr.ru.
Дизайн, верстка: РГ «Домино», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 22-22-21.
Тираж: 500 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии «Домино».

